

Rzeczpospolita
PolskaPolitechnika
WarszawskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Rachunek Prawdopodobieństwa i Elementy Statystyki Matematycznej

Anna Dembińska

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych

Laboratorium 5

Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 10 pn. „Modyfikacja programów studiów na kierunkach
prowadzonych przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych”,
realizowane w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja –
Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. TESTOWANIE ZGODNOŚCI

ZADANIE 5.1 Losową próbę studentów spytano o ich ulubiony przedmiot. Otrzymano następujące odpowiedzi:

Przedmiot	Fizyka	WF	Mechanika	Statystyka
Liczba studentów, którzy najbardziej lubią ten przedmiot	380	340	380	500

Na poziomie istotności 0.05 sprawdzić hipotezę, że rozkład preferencji jest równomierny.

ZADANIE 5.2 Zbadano grupę krwi 100 osób. Grupę 0 miało 36 osób, A - 42 osoby, B - 14 osób i grupę AB - 8 osób. Zweryfikować hipotezę, że prawdopodobieństwa wystąpienia grup krwi 0, A, B, AB w populacji są równe odpowiednio: 0.4; 0.4; 0.1; 0.1. Przyjąć poziom istotności 0.05.

ZADANIE 5.3 Aby zaliczyć programowanie Maciek musi napisać program generujący liczby losowe z rozkładu dwumianowego o parametrach 3 i 0,5. Co więcej, Maciek musi wykazać, że jego program pracuje prawidłowo. W tym celu nasz bohater wygenerował 200 liczb i otrzymał następujące wyniki:

Wygenerowana liczba losowa	0	1	2	3
Liczba uzyskanych wyników	24	73	77	26

Czy na poziomie istotności 0,05 można stwierdzić, że generator Macieka działa prawidłowo?

WSKAZÓWKA: Dla X o rozkładzie dwumianowym $\text{bin}(n, p)$ funkcja `dbinom(x=k, size=n, prob=p)` podaje prawdopodobieństwo $P(X = k)$.

ZADANIE 5.4 Naukowiec chce sprawdzić czy liczba cząstek emitowanych przez pewną substancję promieniotwórczą w ciągu 10-ciu sekund jest zmienną losową o rozkładzie Poissona. W tym celu zbadał liczbę cząstek, które zostały wyemitowane przez tą substancję w ciągu dziesięciosekundowych odcinków czasu i zebrane dane zapisał w poniższej tabelce:

liczba wyemitowanych cząstek w ciągu 10-ciu sekund	0	1	2	3	4	5
liczba przypadków, kiedy zostało wyemitowanych tyle cząstek	140	280	235	200	100	45

Jakie wnioski wyciągnie naukowiec na poziomie istotności 0,1?

ZADANIE 5.5 Posługując się pakietem R i ustalając ziarno generatora równe 4411 wygenerować 200 liczb z rozkładu wykładniczego o parametrze $\lambda = 2$. Następnie, na poziomie istotności 0.05, sprawdzić, używając testu zgodności chi-kwadrat, czy liczby te rzeczywiście pochodzą z rozkładu wykładniczego.

WSKAZÓWKA: Aby przeprowadzić test zgodności chi-kwadrat musimy najpierw dane zdyskretyzować, dzieląc je do odpowiedniej liczby klas. Wiemy, że pożądanym jest aby prawdopodobieństwa klas p_j^0 były przynajmniej w przybliżeniu równe i by był spełniony warunek, że wszystkie $np_j^0 \geq 5$. Zdecydujemy się na równe prawdopodobieństwa wszystkich klas i wynoszące $\frac{1}{20}$; zagwarantuje to, że $np_j^0 = 10 \geq 5$. Zatem chcemy mieć 20 klas. Jeśli za końce klas (skoro chcemy 20 klas, to potrzebujemy 21 punktów końcowych) przyjmiemy odpowiednie kwantyle rozkładu wykładniczego z parametrem λ , wyszacowanym metodą największej wiarygodności,

```
> konce.przedzialow=qexp(seq(0,1,length.out=21),estymator.lambdy)
```

to dla każdej klasy rzeczywiście będziemy mieć $p_j^0 = \frac{1}{20}$. Pozostaje zliczyć ile obserwacji wpadło do poszczególnych klas. Możemy to zrobić używając funkcji `cut()` i `table()`:

```
> licznosci.klas=table(cut(x=probka,breaks=konce.przedzialow))
```

ZADANIE 5.6 Używając testu Kołmogorowa-Smirnowa, sprawdzić czy liczby wygenerowane w zadaniu 5.5 rzeczywiście pochodzą z rozkładu wykładniczego o parametrze $\lambda = 2$. Przyjąć poziom istotności $\alpha = 0,01$.

ZADANIE 5.7 W kolumnie *czas* w pliku *infolinia.txt* zapisano czasy oczekiwania (w min.) na połączenia z pewną infolinią. Używając testu Kołmogorowa-Smirnowa, sprawdzić czy można uznać, że prezentowane czasy pochodzą z rozkładu gamma $\text{Gamma}(a, s)$ z parametrem kształtu $a = 4$ i parametrem skali $s = 0,3$. Przyjąć poziom istotności $\alpha = 0,05$.

WSKAZÓWKA: Funkcja `pgamma(x,shape=a,scale=s)` wyznacza dystrybuantę rozkładu gamma $\text{Gamma}(a, s)$.

ZADANIE 5.8 Używając testu zgodności chi-kwadrat Pearsona sprawdzić czy czasy oczekiwania, o których mowa w poprzednim zadaniu, pochodzą z

(a) rozkładu gamma,

(b) rozkładu gamma $\text{Gamma}(a, s)$ z parametrem kształtu $a = 4$ i parametrem skali $s = 0,3$.

Przyjąć poziom istotności 0,05.

ZADANIE 5.9

(a) Wygenerować po $N = 1000$ liczb z następujących rozkładów:

- (a1) normalnego o średniej $= 20$ i odchyleniu standardowym $= 5$,
- (a2) jednostajnego na przedziale $(-1, 1)$,
- (a3) wykładniczego o średniej $= 5$,
- (a4) Poissona o średniej $= 3$.

WSKAZÓWKA: (a1) rnorm (a2) runif (a3) rexp (a4) rpois

(b) Dla każdej wygenerowanej próbki sporządzić wykres normalności i wykresy te wyświetlić w jednym oknie. Przeanalizować ich kształt.

(c) Dla każdej wygenerowanej próbki sporządzić wykres skrzynkowy i wykresy te wyświetlić w jednym oknie. Przeanalizować ich kształt.

(d) Dla każdej wygenerowanej próbki sporządzić histogram częstości i nanieść na niego jądrowy estymator gęstości. Przeanalizować kształty tych wykresów.

(e) Dla danych wygenerowanych w pkt. (a1) i (a2) przeprowadzić, na poziomie istotności $0,05$, test normalności Shapiro-Wilka.

(f) Punkty (a) - (e) powtórzyć z $N = 100$ i z $N = 10$.

ZADANIE 5.10 Przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,01$ i używając testu normalności Shapiro-Wilka sprawdzić czy można uznać, że dane analizowane w zadaniu 3.5 (dotyczące rocznych zysków w 2004 roku dużych spółek zajmujących się usługami bankowymi) pochodzą z rozkładu normalnego. Sporządzić i przeanalizować wykres skrzynkowy, wykres jądrowego estymatora gęstości i wykres normalności dla tych danych.