

# Wojciech Domitrz : Geometria różniczkowa, wykład 6

Def.

**Dystrybucja** rzędu  $r$  na  $M$  nazywamy rodzinę podprzestrzeni  $D := \{D_p \subset T_p M \mid p \in M\}$  taką, że  $\forall p \in M \exists U$  otoczenie  $p \subset M$

oraz  $\exists X_1, \dots, X_r \in \mathcal{X}(U)$  takie, że  $\forall q \in U$  wektory  $X_1|_q, \dots, X_r|_q$  są bazą  $D_q$ .

Przykład 1)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}|_x, \frac{\partial}{\partial x_2}|_x \right\}$  2)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}|_x \right\}$  3)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_2}|_x, \frac{\partial}{\partial x_3}|_x - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1}|_x \right\}$   
 rank  $D = 2$  rank  $D = 1$  rank  $D = 2$

Def.

**Rozmaitość całkową dystrybucji**  $D$  nazywamy podrozmaitością regularną  $P$  rozmaitości  $M$  taką, że  $\forall p \in P \quad T_p P = D|_p$ .

Def.

Dystrybucja jest **całkowalna** jeśli  $\forall p \in M \exists P$  - podrozmaitość całkową  $D$  taką, że  $p \in P$ .

Przykład 1)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}|_x, \frac{\partial}{\partial x_2}|_x \right\}$   $x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0) \in \mathbb{R}^3$   $P = \{(x_1, x_2, x_3^0) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$

2)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}|_x \right\}$   $x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0) \in \mathbb{R}^3$   $P = \{(x_1, x_2^0, x_3^0) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}$

Def. Dystrybucja jest **inwolucyjna** jeśli  $\forall X, Y \in \mathcal{X}(M) \quad \forall p \in M \quad X|_p, Y|_p \in D_p \Rightarrow [X, Y]|_p \in D_p$

Przykład: 1)  $M = \mathbb{R}^3$   $\left[ f_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + f_2 \frac{\partial}{\partial x_2}, g_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + g_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right] = f_1 \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + f_1 \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_2} + f_2 \frac{\partial g_1}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + f_2 \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_2} - g_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} - g_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_2} - g_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} - g_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_2}$

Stąd  $X, Y \in D_x \Rightarrow [X, Y] \in D_x$

2)  $M = \mathbb{R}^3$   $\left[ f \frac{\partial}{\partial x_1}, g \frac{\partial}{\partial x_1} \right] = f \frac{\partial g}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} - g \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} = \left( f \frac{\partial g}{\partial x_1} - g \frac{\partial f}{\partial x_1} \right) \frac{\partial}{\partial x_1}$   $X, Y \in D \Rightarrow [X, Y] \in D$   $D$  jest involucyjna

3)  $M = \mathbb{R}^3$   $D_x = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_2}|_x, \frac{\partial}{\partial x_3}|_x - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1}|_x \right\}$   $\left[ \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \right] = - \frac{\partial}{\partial x_1} \notin D$   $D$  nie jest involucyjna

Tw. Każda dystrybucja całkowalna jest involucyjna.

Dowód: Niech  $p \in M$ . Niech  $P$  będzie podrozmaitością całkową dystrybucji  $D$  taką, że  $p \in P$ . Wtedy  $D_q = T_q P$  dla  $\forall q \in P$ .

Niech  $X, Y \in \mathcal{X}(M)$  takie że  $\forall q \in M \quad X|_q, Y|_q \in D_q$ . Wtedy  $\forall q \in P \quad X|_q, Y|_q \in T_q P$  Stąd  $X|_p, Y|_p \in \mathcal{X}(P)$

$P$  - jest podrozmaitością regularną. Stąd  $\forall q \in P \quad [X, Y]|_q \in T_q P$  czyli  $[X, Y]|_p \in T_p P = D_p$  ■



Tw. Frobeniusa.

Niech  $D$  będzie dystrybucją involutywną rzędu  $r$  na  $M$ . Wtedy  $\forall p \in M \exists (U, \varphi)$  - mapa na  $M$  taka, że  $p \in U$

oraz  $\forall q \in U \quad D_q = \text{span} \{ \partial_1|_q, \dots, \partial_r|_q \}$ . W szczególności  $P = \{ q \in U : \varphi_j(q) = \varphi_j(p) \text{ dla } j = r+1, \dots, m \}$

jest rozmaitością całkową  $D$  przechodzącą przez  $p$  czyli  $D$  jest całkowalna.

Dowód: Twierdzenie ma charakter lokalny więc można założyć, że  $M = \mathbb{R}^m$ ,  $p = 0$  i  $(x_1, \dots, x_m)$  jest układem

współrzędnych. Niech  $X_1, \dots, X_r$  będą polami na  $\mathbb{R}^m$  rozpinającymi  $D$ . Z tw 2 poprzedniego wynika można

zauważyć, że  $X_1 = \frac{\partial}{\partial x_1}$ . Teza jest więc prawdziwa dla  $r=1$ . Przeprowadzimy dowód indukcyjny twierdzenie ze względu

na rząd dystrybucji  $r$ . Zał, że tw. jest prawdziwe dla każdego involutywnej dystrybucji rzędu  $r-1$ . Niech  $D$

ma rząd  $r$ . Wprowadzimy nowe pole rozpinające  $D$  określone wzorami:  $V_1 = X_1$ ,  $V_i = X_i - (X_i X_1) X_1$  dla  $i = 2, 3, \dots, r$ .

Z tego otrzymujemy, że  $V_i X_1 = \delta_{i1}$  dla  $i = 1, 2, \dots, r$ .  $[V_i, V_j] = \sum_{k=1}^r a_{ij}^k V_k$  dla pewnych  $a_{ij}^k \in C^\infty(M)$ ,  $i, j = 1, \dots, r$

Niech  $P = \{ x \in M \mid x_1 = 0 \}$ . Pole  $V_2, \dots, V_r$  są styczne do  $P$ , gdyż  $V_i X_1 = 0$  dla  $i = 2, \dots, r$ . Wzrost generują one

dystrybucję gen  $(V_2, \dots, V_r)$  rzędu  $(r-1)$  na  $P$ .  $[V_i, V_j] X_1 = \sum_{k=1}^r a_{ij}^k (V_k X_1) = a_{ij}^1$  dla  $i, j = 2, \dots, r$ .  $[V_i, V_j] X_1 = 0$  bo

pole  $V_i, V_j$  dla  $i, j = 2, \dots, r$  są styczne do  $P$  więc  $[V_i, V_j]$  jest styczny do  $P$ . Zatem funkcja  $a_{ij}^1$  znika na  $P$

Zatem  $[V_i, V_j]_q = \sum_{k=2}^r a_{ij}^k(q) V_k|_q$  dla  $\forall q \in P$  czyli  $D|_P$  jest involutywna. Na podstawie założenia indukcyjnego

istnieje w otoczeniu  $p=0 \in P$  lokalny układ współrzędnych  $(y_2, y_3, \dots, y_m)$  taki, że  $\frac{\partial}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_r}$  rozpinają

$D|_P$ . Pole  $\frac{\partial}{\partial y_2}, \frac{\partial}{\partial y_3}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_r}$  znikają na funkcjach  $y_j$  dla  $j \geq r+1$ . Stąd pole wektorowe styczne do  $D|_P$  znikają na

funkcjach  $y_j$  dla  $j \geq r+1$ . W szczególności  $V_i y_j = 0$  dla  $i = 2, \dots, r$  i  $j = r+1, \dots, m$ . Rozpatrzmy w otoczeniu  $0 \in \mathbb{R}^m$

zmiennych  $(x_2, \dots, x_m)$  punkt  $(x_1, x_2, \dots, x_m)$  na podrozmaitości  $P$  oraz funkcje  $u_i(x_1, \dots, x_m)$  dla  $i = 1, \dots, r$  określone wzorami



$u_1 = x_1$   $u_i = y_i(x_2, \dots, x_m)$  dla  $i = 2, \dots, m$ . Wtedy  $\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = 1$   $\frac{\partial u_i}{\partial x_1} = 0$  dla  $i = 2, \dots, m$ .

Stąd jacobian przekształcenia  $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (u_1, \dots, u_m)$  jest równy jacobianowi przekształcenia

$(x_2, \dots, x_m) \mapsto (y_2, \dots, y_m)$ , który jest różny od 0, gdyż  $(y_2, \dots, y_m)$  jest lokalnym układem współrzędnych na  $P$ . Stąd  $(u_1, \dots, u_m)$  jest lokalnym układem współrzędnych w otoczeniu  $0 \in \mathbb{R}^m$ .

Pokażemy, że  $V_i u_j = 0$  dla  $i = 1, 2, \dots, r$ ,  $j = r+1, \dots, m$  w otoczeniu  $0 \in \mathbb{R}^m$ . Zauważmy, że funkcje

$(V_i u_j)(u_1, u_2, \dots, u_m)$  jako funkcje od  $u_1$  przy ustalonych  $(u_2, \dots, u_m)$  spełniają liniowy i jednorodny układ

n. r. z.  $\frac{\partial (V_i u_j)}{\partial u_1} = 0$ ,  $\frac{\partial (V_i u_j)}{\partial u_1} = \sum_{k=1}^m a_{ki}^k V_k u_j$  dla  $i = 2, \dots, r$  z zerowym warunkiem początkowym w punkcie  $u_1 = 0$ .

Układ taki ma jedynie rozwiązanie zerowe.

Pierwsze równanie wynika z tego, że  $V_1 = \frac{\partial}{\partial u_1}$   $\frac{\partial u_j}{\partial u_1} = 0$ . Pozostałe wynikają z tego, że

$$\frac{\partial}{\partial u_1} (V_i u_j) = \frac{\partial}{\partial u_1} (V_i u_j) - V_i \left( \frac{\partial u_j}{\partial u_1} \right) = \left[ \frac{\partial}{\partial u_1}, V_i \right] u_j = [V_1, V_i] u_j = \left( \sum_{k=1}^m a_{ki}^k V_k \right) u_j$$

Należy pokazać, że funkcje  $V_i u_j$  spełniają zerowy warunek początkowy. Dla  $i=1$   $V_1 u_j = \frac{\partial}{\partial u_1} u_j = 0$

Dla  $i = 2, \dots, r$  pole  $V_i$  jest styczne do  $P$ ,  $u_j|_P = y_j$ . Stąd  $V_i u_j = V_i y_j$  na  $P$  dla  $i = 2, \dots, r$ .

Ale pokazaliśmy, że  $V_i y_j = 0$  dla  $i = 2, \dots, r$  i  $j = r+1, \dots, m$ . Czyli pokazaliśmy, że  $V_i u_j = 0$ .



Stąd  $V_i = \sum_{j=1}^m V_i a_j \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_{j=1}^n V_i a_j \frac{\partial}{\partial x_j}$  dla  $i=1, \dots, n$ . Stąd wykazaliśmy, że dystrybucje  $D$  generowane przez pola  $V_1, \dots, V_n$  jest zawarte w całkownej dystrybucji generowanej przez  $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ . Ale obie dystrybucje mają ten sam rząd czyli są równe. Stąd  $D$  jest całkowny. ■