

Wojciech Domitrz : Geometria rozmaitości Riemanna, wykład 3


Tw. (o odwzorowaniu odwrotnym).

Jeśli $W \subset \mathbb{R}^m$ otwarty, $x_0 \in W$ i $f: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest przekształceniem gładkim oraz $\det\left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}\right)\bigg|_{x_0} \neq 0$, to istnieje otoczenie $W_0 \subset W$ punktu x_0 takie, że $f|_{W_0}: W_0 \rightarrow f(W_0)$ jest dyfeomorfizmem.

Tw. Niech M, N będą rozmaitościami gładkimi wymiaru n i $f: M \rightarrow N$ przekształcenie gładkie.

Jeśli $f_{*p}: T_p M \rightarrow T_p N$ jest izomorfizmem to $\exists U$ otoczenie punktu p w M takie, że $f(U)$ jest otoczeniem $f(p)$ w N oraz $f|_U: U \rightarrow f(U)$ jest dyfeomorfizmem.

Dowód:



f_{*p} -izomorfizm $\Rightarrow \det\left(\frac{\partial \tilde{f}^i}{\partial x^j}\right) \neq 0 \Rightarrow$ z tw. o odwzorowaniu odwrotnym

otrzymujemy, że istnieje otoczenie W_0 punktu $x_0 = \varphi(p)$ takie, że

$\tilde{f}|_{W_0}: W_0 \rightarrow \tilde{f}(W_0)$ jest dyfeomorfizmem $\Rightarrow f|_{\varphi^{-1}(W_0)} = \varphi^{-1} \circ \tilde{f} \circ \varphi|_{\varphi^{-1}(W_0)}$ jest dyfeomorfizmem na obraz ■

Tw.(*) Niech M będzie n -wymiarową rozmaitością gładką, a N m -wymiarową rozmaitością gładką, $m < n$.

Jeżeli $f: M \rightarrow N$ jest przekształceniem gładkim i f_{*p} jest nie degenerowane (jest iniekcją) to istnieje lokalny układ współrzędnych (U, φ) w otoczeniu p oraz (V, ψ) w otoczeniu $f(p)$ taki, że $f(U) \subset V$ oraz

$$(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$$

Dowód: Niech $(U; (u^1, \dots, u^m))$ i $(V; (v^1, \dots, v^m))$ będą układami współrzędnych w p i $f(p)$ odpowiednio t.j. $v^j = f^j(u^1, \dots, u^m)$, $j=1, \dots, m$. Zauważ, że $u^i(p) = 0$, $i=1, \dots, m$ oraz $v^j(f(p)) = 0$, $j=1, \dots, m$. f_{*p} jest nie degenerowane to możemy wybrać, że $\frac{\partial(f^1, \dots, f^m)}{\partial(u^1, \dots, u^m)} \neq 0$.

Niech $I_{n-m} = (-\delta, \delta)^{n-m}$. Zmniejszając U i wybierając δ możemy zdefiniować $\tilde{f}: U \times I_{n-m} \rightarrow V$ t.j. $\tilde{f}^i(u^1, \dots, u^m, w^{m+1}, \dots, w^n) = f^i(u^1, \dots, u^m)$ dla $i=1, \dots, m$ i $\tilde{f}^k(u^1, \dots, u^m, w^{m+1}, \dots, w^n) = w^k + f^k(u^1, \dots, u^m)$ dla $k=m+1, \dots, n$. $\tilde{f}_{*}$ w $(0,0)$ jest nie degenerowane. Stąd jest dyfeomorfizmem w otoczeniu $(0,0)$ czyli można wybrać, że $\tilde{f}: U \times I_{n-m} \rightarrow V$ jest dyfeomorfizmem, a $(u^1, \dots, u^m, w^{m+1}, \dots, w^n)$ jest lokalnym układem współrzędnych w otoczeniu $f(p)$. W tym układzie współrzędnych $f(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$, gdzie $\tilde{f}|_{U \times \{0\}} = f$ ■

Def. Niech M, N gładkie rozmaitości. Jeśli istnieje przekształcenie gładkie $f: M \rightarrow N$ takie, że $\forall p \in M$ przekształcenie $f_{*p}: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ jest nierodegenerowane to f nazywamy **immersją** i (f, M) nazywamy **immersyjną podrozmaitością** rozmaitości N . Jeśli dodatkowo f jest injekcją to f nazywamy **zaimowaniem** i (f, M) nazywamy **gładką podrozmaitością** lub **podrozmaitością zaimowaną** rozmaitości N .

Przykład 1. (Podrozmaitości otwarte) $U \subset N$ otwarty. Otrzymamy strukturę różniczkową na N do U . Wtedy U jest rozmaitością gładką $\dim U = \dim N$. $\text{id}_U: U \hookrightarrow N$. Wtedy (id_U, U) jest podrozmaitością zaimowaną zwaną **podrozmaitością otwartą**.

Przykład 2. (Podrozmaitości domknięte). Niech (f, M) będzie podrozmaitością gładką rozmaitości N taką, że

1) $f(M)$ jest domkniętym podzbiorem N 2) $\forall q \in f(M) \exists (U, \varphi)$ układ współrzędnych na N taki, że

$$\varphi(f(M) \cap U) = \{(u^1, \dots, u^m) \in \varphi(U) \mid u^{m+1} = \dots = u^n = 0\}, \text{ gdzie } n = \dim N \text{ i } m = \dim M,$$

to (f, M) nazywamy **podrozmaitością domkniętą** rozmaitości N .

Niech $S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ i $\text{id}_{S^m}: S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$. Wtedy (id_{S^m}, S^m) jest podrozmaitością domkniętą $\mathbb{R}^{m+1}$.

Przykład 3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ $f(t) = (2 \cos(t - \frac{\pi}{2}), \sin 2(t - \frac{\pi}{2}))$. Patrz Rysunek 1 na str. 3. $(f, \mathbb{R})$ jest immersyjną podrozmaitością ale nie jest gładką podrozmaitością.


Przykład 4. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ $g(t) = (-2 \sin(2 \arctg(t)), \sin(4 \arctg(t)))$. Patrz Rysunek 2 na str. 4. $(g, \mathbb{R})$ jest podrozmaitością gładką. Dla $g(0) = (0, 0)$, ale również $\lim_{t \rightarrow \pm \infty} g(t) = (0, 0)$. Stąd $(g, \mathbb{R})$ nie jest podrozmaitością domkniętą $\mathbb{R}^2$.

Przykład 5. $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ $h(t) = (\cos 2t \sin t, \cos 2t \cos t)$. Patrz Rysunek 3 na str. 5. $(h, \mathbb{R})$ jest immersyjną podrozmaitością, ale nie jest podrozmaitością gładką.


Przykład 6. Warszawska (zagęszczona) sinusoida $s(t) = \begin{cases} (t, \sin \frac{1}{t}) & \text{dla } t \in (0, \frac{1}{\pi}) \\ \text{kończąca gładką łukową pomiędzy } (\frac{1}{\pi}, 0) \text{ i } (0, 1) & \text{dla } t \in [\frac{1}{\pi}, 1] \\ (0, 2-t) & \text{dla } t \in [1, 2] \end{cases}$

Patrz Rysunek 4 na str. 6. Wtedy $(s, (0, 3))$ jest podrozmaitością gładką, ale nie jest podrozmaitością domkniętą.


Rysunek 1.




Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4



Przykład 7. Torus $T^2 = S^1 \times S^1$ jest 2-wymiarową rozmaitością. Możemy ją przedstawić jako kwadrat jednostkowy podzielony przez relację utożsamiającą punkty na brzegach przeciwległych $(0, x) \sim (1, x)$ i $(x, 0) \sim (x, 1)$ lub jako $\mathbb{R}^2$ podzielony przez relację $(x, y) \sim (x', y')$ jeśli $x - x' \in \mathbb{Z}$ i $y - y' \in \mathbb{Z}$ czyli $x = x' \bmod 1$ i $y = y' \bmod 1$.

Niech $a, b \in \mathbb{R}$. $r(t) = (at \bmod 1, bt \bmod 1)$.

Jeżeli $\frac{a}{b} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ to $(r, \mathbb{R})$ jest podzłożnością gęstą T^2 , ale $r(\mathbb{R})$ jest gęsty w T^2 .

Jeżeli $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ to $(r, \mathbb{R})$ jest podzłożnością immersyjną. Dowód: $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$ $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ $\frac{n}{b} = \frac{m}{a} = q$


$$\varphi(t+q) = (a(t+q), b(t+q)) = (at + aq, bt + bq) = (at + m, bt + n) = (at, bt) = \varphi(t)$$

Na Rysunku 5 przedstawiono obraz r

Rysunek 5


dla $r(t) = (6t \bmod 1, 5t \bmod 1)$

czyli $\frac{a}{b} = \frac{6}{5}$



Na Rysunku 6 przedstawiono obrazy $\varphi((0;100))$, $\varphi((0;200))$, $\varphi((0;300))$, $\varphi((0;400))$, gdzie $\varphi(t) = (t \bmod 1, \sqrt{2}t \bmod 1)$ czyli $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$. Obraz $\varphi(\mathbb{R})$ jest gęsty w T^2 .

Rysunek 6.



Jeżeli (f, M) jest podprzestrzenią gładką to f jest iniekcją i struktura różniczkowa z M może być przeniesiona na $f(M)$.
Wtedy $f: M \rightarrow f(M)$ staje się dyfeomorfizmem.

Z drugiej strony $f(M) \subset N$. Stąd na $f(M)$ można wprowadzić topologię indukowaną z N .

Poprzednio przytłoczyliśmy, że topologie otrzymane z M za pomocą f i topologia indukowana z N nie muszą się zgrać.
Ogólnie topologia z M przeniesiona za pomocą f jest silniejsza od topologii indukowanej z N , bo f jest ciągła.

Def. Niech (f, M) będzie gładką podprzestrzenią N . (f, M) jest **podprzestrzenią regularną** jeśli

$f: M \rightarrow f(M) \subset N$ jest homeomorfizmem na $f(M)$. $f: N \rightarrow M$ nazywamy wtedy **zaimplementowaniem regularnym** M w N .

Tw. Niech (f, M) będzie podprzestrzenią gładką N .

(f, M) jest podprzestrzenią regularną $N \Leftrightarrow (f, M)$ jest podprzestrzenią domkniętą zwartej podprzestrzeni N

Dowód.: $\Leftarrow$ Niech $p \in M$. Z def. podprzestrzeni domkniętej istnieje układ współrzędnych $(V, v^1, \dots, v^m)$ w $f(p)$ na N t, że

$f(M) \cap V$ w tym układzie współrzędnych jest dany $(*) v^{m+1} = \dots = v^m = 0$. f jest ciągła. Stąd istnieje lokalny układ

współrzędnych $(U; u^1, \dots, u^m)$ w p na M t, że $f(U) \subset V$. Możemy zał, że $u^i(p) = 0$ dla $i = 1, \dots, m$ oraz

$v^j(f(p)) = 0$ dla $j = 1, \dots, m$ oraz $V = (-\delta, \delta)^m$. $f(U) \subset f(M) \cap V$.

Trzeba udowodnić, że $f^{-1}: f(M) \rightarrow M$ jest ciągła. Wystarczy pokazać, że istnieją $\delta_1 > 0$ t, że $f(M) \cap (-\delta_1, \delta_1)^m \subset f(U)$

Z $(*)$ otrzymujemy, że $f|_U$ jest zadany w układzie współrzędnych wzorami $v^i = f^i(u^1, \dots, u^m)$ dla $i = 1, \dots, m$ oraz

$v^k = 0$ dla $k = m+1, \dots, n$. Stąd jacobien $\frac{\partial(f^1, \dots, f^m)}{\partial(u^1, \dots, u^m)} \neq 0$. Wiąc z tw. o odwzorowaniu odwrotnym (patrz str. 1)

istnieje δ_1 t, że $0 < \delta_1 < \delta$ oraz odwzorowanie odwrotne $u^i = g^i(v^1, \dots, v^m)$ $|v^i| < \delta_1$ $i = 1, \dots, m$ dla $(f^1, \dots, f^m)$

Niech $V_1 = (-\delta_1, \delta_1)^m$. Wtedy $f(M) \cap V_1 \subset f(U)$.

$\Rightarrow$ Zał., że (f, M) jest regularną podprzestrzenią N . Niech $p \in M$. Dla każdego otoczenia $U \subset M$ punktu p istnieje otoczenie V punktu $f(p)$ t.j. $f(U) = f(M) \cap V$. Z Tw. (*) (patrz str. 1) istnieje układ współrzędnych $(U_1, u^1, \dots, u^m)$ dla p oraz $(V_1, v^1, \dots, v^m)$ dla $f(p)$ takie, że $f(U_1) \subset V_1$ oraz $f(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$ w tych układach. Możemy założyć, że $U_1 \subset U$. Możemy wybrać $V_1 \subset V$ taki, że $f(U_1) = f(M) \cap V_1$ i $f(M) \cap V_1$ jest relatywnie płaski przez $v^{m+1} = \dots = v^h = 0$. (***)

$\forall q \in f(M)$ niech V_q oznacza otoczenie $q = f(p) \in N$ skonstruowane powyżej spełniające (***)
Niech $W = \bigcup_{q \in f(M)} V_q$. W jest otwartą podprzestrzenią N zawierającą $f(M)$. Trzeba pokazać, że $f(M)$ jest relatywnie domkniętą w W t.j. $\overline{f(M)} \cap W = f(M)$, gdzie $\overline{f(M)}$ oznacza domknięcie $f(M)$ w N . Niech $s \in W \cap \overline{f(M)}$.

domknięta w W t.j. $\overline{f(M)} \cap W = f(M)$, gdzie $\overline{f(M)}$ oznacza domknięcie $f(M)$ w N . Niech $s \in W \cap \overline{f(M)}$. Z definicji $W \exists q \in f(M)$ taki, że $s \in V_q$. Z (***) wynika że $f(M) \cap V_q$ to $v^{m+1} = \dots = v^h = 0$ czyli jest relatywnie domkniętym podzbiorem V_q . $s \in \overline{f(M)} \cap V_q \Rightarrow s$ należy do relatywnego domknięcia $f(M) \cap V_q$ w V_q czyli $s \in f(M) \cap V_q$. Stąd $W \cap \overline{f(M)} \subset f(M)$. Stąd (f, M) jest podprzestrzenią

domkniętej otwartej podprzestrzeni W przestrzeni N . ■

Wniosek. Podprzestrzeń (f, M) przestrzeni N jest regularną podprzestrzenią $\Leftrightarrow \forall p \in M \exists (V, v^1, \dots, v^h)$ układ współrzędnych $f(p) \in N$ t.j. $v^i(f(p)) = 0$ dla $i = 1, \dots, m$ oraz $f(M) \cap N$ jest opitą

$$v^{m+1} = v^{m+2} = \dots = v^h = 0.$$

Tw. Niech (f, M) będzie podzaimością gładką rozmaitości gładkiej N . Jeżeli M jest zwarty to (f, M) jest regularną podzaimością. Dowód: $f(M)$ jest podprzestrzenią topologizującą N - przestrzeń Hausdorffa. Stąd $f(M)$ jest przestrzenią Hausdorffa.

$f: M \rightarrow f(M)$ jest 1-1 ciągłym przekształceniem ze zbioru zwanego M w przestrzeń Hausdorffa.

Pokażemy, że $f: M \rightarrow f(M)$ jest homeomorfizmem. Niech $g = f^{-1}: f(M) \rightarrow M$. Niech $B \subset M$ domknięty.

M -zwarty. Stąd B - zwarty (Lemat 1). $g^{-1}(B) = f(B)$ B -zwarty to $f(B)$ - zwarty, bo f - ciągłe.

$f(B)$ - zwarty $f(B) \subset f(M)$ - p. Hausdorffa to $f(B)$ - domknięty (Lemat 2). Czyli g^{-1} - ciągłe.

Stąd f jest homeomorfizmem. ■

Lemat 1. $B \subset M$ M -zwarty, B domknięty $\Rightarrow B$ zwarty

Dowód Lematu 1. Niech U_i - otwarty dla $i \in I$ $\bigcup_{i \in I} U_i \supset B$ $(M \setminus B) \cup \bigcup_{i \in I} U_i \supset M$ zwarty $\Rightarrow \bigcup_{k=1}^n U_{i_k} \cup (M \setminus B) \supset M$

$\bigcup_{k=1}^n U_{i_k} \supset B$ ■

Lemat 2. X - przestrzeń Hausdorffa, $B \subset X$, B - zwarty $\Rightarrow B$ - domknięty

Dowód Lematu 2. Pokażemy, że $X \setminus B$ jest otwarty. Niech $x \in X \setminus B$, $b \in B$ $x \neq b$ X - p. Hausdorffa

to $\exists U(b) \ni x$ $U(b)$ otwarty oraz $\exists V(b) \ni b$ otwarty $U(b) \cap V(b) = \emptyset$ $\bigcup_{b \in B} V(b) \supset B$ - zwarty $\Rightarrow \bigcup_{k=1}^n V(b_k) \supset B$

$\bigcap_{k=1}^n U(b_k)$ - otwarty $V(b_k) \cap U(b_k) = \emptyset$ $\bigcap_{l=1}^n U(b_l) \cap V(b_k) = \emptyset$ dla $k=1, \dots, n \Rightarrow \bigcap_{l=1}^n U(b_l) \cap \bigcup_{k=1}^n V(b_k) = \emptyset$

$\Rightarrow B \subset \bigcup_{k=1}^n V(b_k) \Rightarrow \bigcap_{l=1}^n U(b_l) \cap B = \emptyset \Rightarrow \bigcap_{l=1}^n U(b_l) \subset X \setminus B$ $x \in U(b_l)$ dla $l=1, \dots, n$

$x \in \bigcap_{l=1}^n U(b_l)$ - otwarty ■